

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

VERIZINA **cinnarizina e dimenidrinato** **20 mg/40 mg compresse**

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è VERIZINA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare VERIZINA
3. Come usare VERIZINA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare VERIZINA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è VERIZINA e a cosa serve

VERIZINA contiene due principi attivi. Uno è la cinnarizina e l'altro è il dimenidrinato. Le due sostanze appartengono a differenti gruppi di medicinali. La cinnarizina appartiene al gruppo dei calcioantagonisti, mentre il dimenidrinato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antistaminici.

Entrambe le sostanze agiscono riducendo i sintomi delle vertigini (una sensazione di capogiro o di giramento di testa) e della nausea (malessere). Quando queste due sostanze sono utilizzate in associazione, queste sono più efficaci rispetto al singolo utilizzo di ciascuna di esse.

VERIZINA è usato per il trattamento di vari tipi di vertigini negli adulti. Le vertigini possono avere un numero di differenti cause. L'uso di VERIZINA può aiutare a svolgere le attività quotidiane rese difficili dalla presenza di vertigini.

2. Cosa deve sapere prima di usare VERIZINA

Non prenda VERIZINA:

- se ha un'età inferiore a 18 anni
- se è allergico alla cinnarizina, al dimenidrinato o alla difenidramina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se è allergico a qualsiasi altro antistaminico (come l'astemizolo, la clorfeniramina e la terfenadina, impiegati come medicinali antiallergici). Non deve assumere questo medicinale a meno che non le sia stato prescritto dal medico
- se soffre di glaucoma ad angolo chiuso (un tipo particolare di malattia dell'occhio)
- se è affetto da epilessia
- se presenta un aumento della pressione all'interno del cervello (ad es. a causa di un tumore)
- se ha problemi di abuso d'alcol
- se ha problemi prostatici che le provocano difficoltà nell'urinare
- se ha un'insufficienza epatica e/o renale.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere VERIZINA se soffre di:

- pressione del sangue alta o bassa
- pressione oculare alta
- occlusione intestinale
- ingrossamento della prostata
- tiroide iperattiva
- gravi problemi al cuore
- malattia di Parkinson.

L'uso di VERIZINA può peggiorare queste condizioni. VERIZINA può comunque essere indicato per lei ma il medico deve tenere presente questi fattori.

Altri medicinali e VERIZINA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

VERIZINA può interagire con altri medicinali che sta assumendo.

L'assunzione di VERIZINA con i medicinali elencati di seguito può renderla stanco o assonnato:

- barbiturici (medicinali spesso assunti per indurre uno stato di calma)
- analgesici narcotici come la morfina (antidolorifici forti come la morfina)
- tranquillanti (un tipo di medicinali usati per il trattamento della depressione e dell'ansia)
- inibitori delle monoamminossidasi (usati per il trattamento della depressione e dell'ansia).

VERIZINA può potenziare gli effetti dei seguenti medicinali:

- antidepressivi triciclici (usati per il trattamento della depressione e dell'ansia)
- atropina (un medicinale che rilassa i muscoli ed è spesso utilizzato negli esami dell'occhio)
- efedrina (può essere usata per il trattamento della tosse o del naso chiuso)
- procarbazina (un medicinale usato per il trattamento di alcuni tipi di cancro)
- medicinali usati per abbassare la pressione del sangue.

Gli aminoglicosidi (un tipo di antibiotici) possono danneggiare l'orecchio interno. Se assume VERIZINA, è possibile che non si accorga di tale danno.

Non deve prendere VERIZINA con i farmaci usati per correggere i problemi del battito cardiaco (antiaritmici).

VERIZINA può inoltre alterare la risposta della pelle ai test allergici.

VERIZINA con cibi, bevande e alcol

VERIZINA può provocare indigestione, che può essere ridotta assumendo le compresse dopo i pasti. Non beva alcol durante il trattamento con VERIZINA perché può provocare stanchezza o sonnolenza.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Non prenda VERIZINA se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

VERIZINA può provocare sonnolenza. In tal caso non deve guidare o utilizzare macchinari.

3. Come usare VERIZINA

Prenda sempre VERIZINA seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1 compressa tre volte al dì, da assumersi dopo i pasti con un po' di liquido. Ingerisca la compressa intera senza masticarla.

Generalmente prenderà VERIZINA al massimo per 4 settimane. Il medico le dirà se deve assumere VERIZINA più a lungo.

Se prende più VERIZINA di quanto deve

Se assume accidentalmente troppe compresse o se un bambino ne ha ingerita qualcuna, consulti con urgenza un medico.

L'assunzione di una quantità eccessiva di VERIZINA può farla sentire molto stanca, assonnata e instabile. Le pupille possono dilatarsi e può non riuscire a urinare. Può manifestare bocca secca, arrossamento del volto, accelerazione della frequenza cardiaca, febbre, sudorazione e cefalea.

Se assume una dose massiccia di VERIZINA può sviluppare convulsioni, allucinazioni, pressione sanguigna elevata, può sentirsi scosso, eccitato e avere difficoltà respiratorie. Può andare in coma.

Se dimentica di prendere VERIZINA

Se dimentica di prendere una compressa di VERIZINA, deve saltare quella dose. Prenda la compressa successiva di VERIZINA all'orario abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con VERIZINA

Non interrompa l'assunzione con VERIZINA prima che sia il suo medico a indicarglielo. Se interrompe il trattamento troppo presto, è probabile che i sintomi delle vertigini (sensazione di capogiro e di giramento di testa) tornino a manifestarsi.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (interessano fino a 1 persona su 10):

- sonnolenza,
- bocca secca,
- mal di testa,
- mal di stomaco.

Questi sono solitamente di lieve entità e scompaiono nell'arco di alcuni giorni pur continuando il trattamento con VERIZINA.

Effetti indesiderati non comuni (interessano fino a 1 persona su 100):

- sudorazione,
- arrossamento della pelle,
- indigestione,
- nausea (malessere),
- diarrea,
- nervosismo,
- crampi,
- dimenticanza,
- tinnito (ronzio nelle orecchie),
- parestesia (formicolio di mani e/o piedi),

- tremore.

Effetti indesiderati rari (interessano fino a 1 persona su 1000):

- compromissione della vista,
- reazioni allergiche (es. reazioni della pelle),
- sensibilità alla luce,
- difficoltà nell'urinare.

Effetti indesiderati molto rari (interessano meno di 1 persona su 10.000):

- riduzione del numero dei globuli bianchi e delle piastrine,
- notevole riduzione del numero dei globuli rossi, che può causare debolezza, formazione di lividi o aumento della probabilità di sviluppare infezioni.

Se soffre di infezioni con febbre e grave peggioramento delle condizioni generali di salute, si rivolga al medico e lo informi del medicinale che sta assumendo.

Altre possibili reazioni (la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) che possono verificarsi con questo tipo di medicinale comprendono:

- aumento di peso,
- stitichezza,
- sensazione di oppressione toracica
- ittero (ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi dovuto a problemi del sangue o del fegato),
- peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso (una malattia degli occhi caratterizzata da un aumento della pressione all'interno dell'occhio),
- movimenti non controllati,
- eccitazione e irrequietezza insolite (in particolare nei bambini),
- gravi reazioni della pelle.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare VERIZINA

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene VERIZINA

- I principi attivi sono la cinnarizina e il dimenidrinato. Ogni compressa contiene 20 mg di cinnarizina e 40 mg di dimenidrinato.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, ipromellosa, croscarmellosa sodica, talco e magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di VERIZINA e contenuto della confezione

Le compresse di VERIZINA sono di colore bianco, di forma rotonda e convessa.

VERIZINA è disponibile in confezioni da 20 o 50 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttoreTitolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Stewart Italia S.r.l., Via Larga, 15, 20122 Milano

Produttore

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A. - Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira - 2710-089 Sintra – Portogallo

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Italia: VERIZINA

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 02/2020.